

Navodilo za uporabo

Strepsils brez sladkorja z okusom jagode 0,6 mg/1,2 mg pastile amilmetakrezol/2,4-diklorobenzilalkohol

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom.

Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode
3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

1. Kaj je zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode in za kaj ga uporabljamo

Amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti.

Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode uporabljamo za ublažitev simptomov vnetja žrela in okužb v ustni votlini in žrelu.

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode

Ne uporabljajte zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode

- če ste alergični na zdravilni učinkovini ali katerokoli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6).
- pri otrocih, mlajših od 6 let.

Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte z zdravnikom.

Priporočenih odmerkov zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode ne smete preseči. Uporabite najnižji učinkovit odmerek za najkrajše možno trajanje zdravljenja.

Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Druga zdravila in zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katerikoli drugo zdravilo.

Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode skupaj s hrano in pijačo

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila.

Neposredno po jemanju zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila

odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela.

Nosečnost, dojenje in plodnost

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ker ni dovolj podatkov o varnosti uporabe zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode med nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva.

Podatki o vplivu zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode na plodnost niso na voljo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode vsebuje tekoči maltitol in izomalt, ki imata lahko blag odvajalni učinek.

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Priporočen odmerek je:

Odrasli: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.

Največji dnevni odmerek zdravila je 12 pastil.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Otroci, starejši od 6 let, in mladostniki: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo. Največji dnevni odmerek zdravila je 6 pastil.

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let.

Starostniki: posebno prilagajanje odmerka ni potrebno.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Spodnji seznam neželenih učinkov se nanaša na kratkotrajno uporabo zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode. V primeru dolgotrajnega zdravljenja kroničnih težav se lahko pojavijo dodatni neželeni učinki.

Možni neželeni učinki, ki se lahko pojavijo:

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):

- preobčutljivostna reakcija, otekanje ust in žrela, pekoč občutek v ustih in žrelu, zbadanje v ustih, izpuščaj

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):

- boleč jezik

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov):

- prebavne motnje, slabost

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Interna klinika

Center za zastrupitve

Zaloška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

Faks: + 386 (0)1 434 76 46

e-pošta: farmakovigilanca@kclj.si.

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

5. Shranjevanje zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojninu. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

Kaj vsebuje zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode

- Zdravilni učinkovini sta amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol. Ena pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola in 1,2 mg 2,4-diklorobenzilalkohola.
- Druge sestavine zdravila so: izomalt (E953), tekoči maltitol (E965), vinska kislina, natrijeva sol saharina (E954), aroma jagode in antociani (E163).

Izgled zdravila Strepsils brez sladkorja z okusom jagode in vsebina pakiranja

Zdravilo Strepsils brez sladkorja z okusom jagode je na voljo v obliki okroglih rožnatih pastil. Pastile imajo okus po jagodah in znak "S" na obeh straneh.

Na voljo so v kartonski škatli s 24 pastilami (2 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in aluminijaste folije).

Način izdajanja zdravila

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire
SL1 3UH, Velika Britanija

Izdelovalec

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB,
Velika Britanija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne

15. 9. 2015